定期予防接種の種類と接種方法（乳幼児）

対象疾病	ワクチン	接種対象年齢	回数	標準的な接種年齢	方法
ロタウィルス感染症	ロタリックス	生後6週～24週まで	1回目	生後2月に至った日から出生14週6日まで	経口接種
	ロタテック		2回目	1回目から27日以上あけて生後24週まで	
		生後6週～32週まで	3回目	（ロタテックのみ）2回目から27日以上あけて生後32週まで	
B型肝炎	B型肝炎ワクチン	1歳に至るまでの間	初回	生後2月から9月の間に27日以上の間隔で2回接種	皮下接種
			追加	1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種	
小児肺炎球菌感染症	13価肺炎球菌結合ワクチン 又は15価肺炎球菌結合ワクチン	生後2月から生後7月に至るまで	初回	生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種	皮下接種又は筋肉内接種
			追加	初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月以降に1回接種	
		生後2月から生後12月に至るまで	初回	生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回接種	
			追加	初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月以降に1回接種	
		生後2月から生後24月に至るまで		60日以上の間隔をおいて2回接種	
		生後24月から生後60月に至るまで		生後24月～生後60月に至るまでに1回接種	
ジフテリア 百日ぜき 破傷風 急性灰白髄炎（ポリオ） ヒブ感染症	五種混合ワクチン	生後2月に達した時から生後90月に達するまで	第1期初回	生後2月から生後12月までの間に、20～56日までの間隔で3回接種	皮下接種又は筋肉内接種
			第1期追加	初回接種終了後12月から18月までの間に1回接種	
ジフテリア 百日ぜき 破傷風 急性灰白髄炎（ポリオ）	四種混合ワクチン	生後2月に達した時から生後90月に至るまで	第1期初回	生後2月から生後12月までの間に、20～56日までの間隔で3回接種	皮下接種
			第1期追加	初回接種終了後12月から18月までの間に1回接種	
ヒブ感染症	ヒブワクチン	生後2月に達した時から生後60月に至るまで		生後2月から生後7月に至る者 　初回：生後12月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種 　追加：初回接種終了後7月以上の間隔で1回接種 生後7月から生後12月に至る者 　初回：生後12月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種 　追加：初回接種終了後7月以上の間隔で1回接種 生後12月から60月に至る者　1回接種	皮下接種
結核	BCGワクチン	1歳に至るまでの間		生後5月～生後8月未満に1回	経皮接種
麻しん・風しん	MRワクチン		1回目	生後12月から生後24月に至るまでの間に1回	皮下接種
			2回目	5歳以上7歳未満（小学校就学前1年間/4月1日～3月31日）	
水痘	水痘ワクチン	生後12月から生後36月に至るまで	1回目	生後12月から生後15月未満に至るまでの間に1回	皮下接種
			2回目	1回目接種後6月から12月までの間隔をおく	
日本脳炎	日本脳炎ワクチン	生後6月から生後90月に至るまでの間	第1期初回	3歳から4歳未満で6～28日間隔で2回接種	皮下接種
			第1期追加	1期初回接種終了後、1年経過した時期に1回接種	